



Draag voorgeschreven beschermingsmiddelen. Hou het team zo klein mogelijk
(Zorg voor een masker en ballon in de buurt van ieder kritisch ziek kind)

ZORG VOOR EEN VEILIGE OMGEVING

Kind reageert niet

Open de luchtweg



Controleer de ademhaling door alleen te kijken.

Ademhaling niet normaal

Geef 5 initiëlebeademingen



Beadem alleen met masker en ballon indien beschikbaar. Anders begin thoraxcompressies zonder beademing.

Tenzij overtuigde tekenen van leven

15 thoraxcompressies

2 beademingen
15 thoraxcompressies

Kinder-ALS

Roep iemand erbij



TWEEDE HULPVERLENER:

- Roep om professionele hulp (telefoon op speaker)
- Haal een **AED**

- Masker-en-ballonbeademing 100% O₂ (evt. 2-persoonstechniek)
- Anders mond-op-(neus-en-)mond of pocketmasker

INDIEN ALLEEN:

- Roep om professionele hulp (telefoon op speaker)
- Haal en **AED** in geval van plotseling collaps (indien beschikbaar)

Zodra beschikbaar: Masker en ballon beademing met zo min mogelijk lek. Waar nodig m.b.v. 2 personen methode.